

全ての項目を記入し、受診当日に受付スタッフへご提出ください。

■受診当日 朝の体温（ ℃） 受付時の体温（ ℃）※受付で検温します。

1	37.2℃以上の発熱がある (受診日から1週間前まで)	はい	いいえ
2	咽頭痛、咳、痰、呼吸困難、息切れ、強いだるさがある ※1 (1週間以内に強く出現したもの)	はい	いいえ
3	鼻水、鼻づまり、嗅覚(におい)、味覚(あじ)の低下がある ※1 (1週間以内に強く出現したもの)	はい	いいえ
4	頭痛、関節痛、筋肉痛がある ※1 (1週間以内に強く出現したもの)	はい	いいえ
5	下痢、嘔気、嘔吐がある (1週間以内に強く出現したもの)	はい	いいえ
6	免疫抑制剤や抗がん剤を用いた治療をしている	はい	いいえ
7	日常生活の中で3密(密閉・密集・密接)の環境で過ごすことが多い	はい	いいえ
8	1週間以内に、法務省や厚労省が定める諸外国への渡航歴がある、 またはそれらの方と家庭や職場での接触歴がある 「はい」の場合、国名をご記入ください。 (国名:)	はい	いいえ
9	1週間以内に、 新型コロナウイルス感染症患者やその疑いがある者と接触歴がある (同居者や職場内に発熱者がいた場合を含む)	はい	いいえ
10	新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触の可能性があり、待機期間内である (自主待機含む)	はい	いいえ
11	新型コロナウイルス感染症に感染したことがある ※2 「はい」の場合、(感染発覚日: 月 日)	はい	いいえ
12	新型コロナワクチンを接種したことがある 「はい」の場合、(1回目接種日: 月 日) (2回目接種日: 月 日) (3回目接種日: 月 日)	はい	いいえ

※1 慢性的に頭痛がある、喘息で咳が出る、花粉症で鼻づまりがある、
原因が明らかな筋肉痛や関節痛がある等の方は、その旨スタッフにお申し出ください。

※2 本来は感染後1カ月程度経過後の方が、健診結果への影響が少ないと考えられるため、
自覚症状が著しい場合は、医師の判断により健診延期をお勧めする場合がございます。

年 月 日 お名前 _____

↓こちらもご記入ください。


新型コロナウイルス抗体検査(オプション) ※詳細裏面

いずれかにチェックしてください。

- 申込む (N)抗体検査 ※過去の感染歴 税込5,500円
- 申込む (S)抗体検査 ※ワクチン接種による中和抗体の有無 税込5,500円
- 申込む (N)抗体・(S)抗体セット 税込8,800円
- 不要
- 既に予約済み

注意:(S)抗体検査は、ワクチン接種から14日以降にご受診ください。

2種類の抗体検査の違い



ヌクレオカプシドタンパク質 (N)

ヌクレオカプシドタンパク質に対する抗体 (**(N)抗体**) の保有は、新型コロナウイルスに感染したことがある可能性を示唆します。



(N)抗体

スパイクタンパク質 (S)

スパイクタンパク質に対する抗体 (**(S)抗体**) は新型コロナウイルスに感染あるいはワクチン接種により中和抗体が産生された可能性を示唆します。



(S)抗体

	新型コロナウイルス抗体検査	
	(N)抗体	(S)抗体
検査目的	ヌクレオカプシド(N)を検出し、過去の感染歴を調べる検査	スパイク(S)を検出し、ワクチン接種後の中和抗体がどれくらい獲得できたか調べる検査
どんな時?	過去に新型コロナウイルスに感染したかどうかを調べたい時	ワクチン接種後、中和抗体を獲得したかどうか調べたい時
検査結果	定性検査 (陽性 or 陰性で判定)	定量検査 (0.8U/ml以上で抗体ありと判定)
検査精度	感度 :100% 特異度:99.8%	感度 :98.8% 特異度:100%
注意事項	・ワクチン接種後の中和抗体獲得の判定には適さない	・中和抗体、スパイク抗体等の呼称でも呼ばれている ・(S)抗体を保有していても、抗体量や体調によって新型コロナウイルスに感染する可能性はある ・どれくらいの中和抗体が新型コロナウイルスに有効なのかはまだわかっていない

【備考】

- ・新型コロナウイルス抗体検査についての陰性証明書等の発行は行っていません。
- ・抗体検査を新型コロナウイルス感染症の確定診断に用いることはできません。
- ・抗体検査の結果如何にかかわらず、PCR検査の紹介などは行っていません。